МАСТЕР УПРАВЛЕНИЯ **ДИАБЕТОМ®**



ВКЛЮЧЁН В ПЕРЕЧЕНЬ **ЖНВЛП**6

СУГЛАТ® у пациентов с сахарным диабетом 2 типа:



HbA1c -1,3%

Улучшает контроль гликемии¹



-2,9 кг

Снижает массу тела²



OT -2.9 CM **-12**%

Уменьшает окружность талии и объём висцерального жира³



АЛТ -24

ACT -8

Снижает активность печеночных ферментов и уменьшает воспаление печени5




TΓ -18% ЛПВП +17%

Способствует коррекции дислипидемии¹



САД -9,6 ДАД -5,9





у подменять, получатами и притиграють, возмениция по премя вечения. Частом в междательных реакция у подменять, получатами и притиграють, возмениция по премя вечения. Частом вмеждательных реакция междать (пр. 1000, реакция (1000, 1000, реакция (1000, 1000, реакция (1000, 1000, 1000), частом вмеждательных реакция междать (пр. 1000, реакция (1000, 1000, реакция (1000, реакция (1000, 1000)), частом вмеждать за реакция (1000, реакция (1000, 1000, реакция (1000, реакция (1000, 1000)), частом вмеждать за реакция. В премя в премя верхительной премя премя премя в премя премя премя премя премя премя премя реакция (1000, 1000, реакция (1000, реакция (1000, 1000, реакция (1000, реакци случаев были легкими, реже – средней тяжести; о тяжёлых случаях не сообщалось. Увеличение дова и продолжительности и ичениям не влияло на частоту нежелетельных реакций, связенных с уменьшения ОЦК. Инфекция мочевыводиция прей (МІП). Частов МІП при прейме игра-нифотозная такка же, как на плацеб. Наиболее часто сообщалось о случаях инфонции мочевы-водиция прей и щистив. Большенство МІП были легими, росе— средней такжети. То такжелых ИМП не сообщалось. Увеличение дозы и продолжительности лечения не влияло на частоту ИМП.
Инфекция половых органов. Частота инфекций половых органов при приёме ипраглифлозина была выше (2,4%), чем на плацебо (0,6%). Наиболее часто сообщалось о случаях вульвоватикального кандидоза и генитального зуда. Большикство инфекций были слабо выраженными; в редких случаях — средней степени тяжести: о тяжёлых случаях не сообщалось. Увеличение дозы и продолжительности лечения не влияло на частоту грибковых инфекцией половых органов. Запор. Случаи запора при приёме ипраглифлозина отмечались у 3,1% пациентов в сравнении с 1,5% яло на частоту запора. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

в отношении ферментов UGT, включая UGT1A1, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 и UGT287. Ингибирующего влияния ипраглифлозина на активность эффлюксных переносчиков Р-др., ВСRР, МRР2 или на транспорт, опосредованный белком множественной резистентности и выведения токсинов 1 (MATE1) и 2-К (MATE2-K), не наблюдалось. Ингибирующих эффектов ипраглифлозина в отношении переносчиков веществ внутрь клетки, таких как ОАТРІВІ, ОАТРІВІ, ОСТІ и ОСТ2, не выявлено. Ис-следования лекарственных взаимодействий с участием здоровых добровольцев не выявили влияние многократного применения ипраглифовзина на фармакокинетику однократнь глимепирида (субстрат СҮР2С9), пиоглитазона (субстрат СҮР2С8), ситаглиптина и интигли тименция уступент стесту, шенима воем уступент стесту, княтима вы тим и пинами. Приём ипрагляфлегам 300 мг один раз в сутки усиливая аффект метформина (ИС) в 1,18 раза, что жимическим не значимо. Таким образом, считается, что ипрагляфлогам не будет вступать в лекарственное взаимодействие с другими препаратами, являющимися субстратами для выше-

уполитуль форменно СТР, ШТ и переносчики. ОСОВЬЕ УКОАВИНЕ. Ворушение буниция по-чен. Партилирован и соверат привнення учениемо сы мозрушению функция почен, коро-нальной стадией поченной недостаточности или у пациентов, неворишение, раз как, веротило, у данной категория пациентов препарат будет венффективен. Во время лечним или разморат денованием на партили объем образованием предмет предмет денованием партилифизиом может на наблюдаться повышение концентрации вретинной и мочетены в провя, а также сижемие рас-«поподалься позышение опщеннующих предпинима и могетами и группы для сиссе спиниме рас-чинной скорсил корфиктор финации (пред начали опщення прираменты при необходим оценть функцию (печье, а также перводическо комуроварять не в процессе пече-ник Применение у пациенто с роском разлития неконалательны режиций, сказанных у меньше-ников ОЦК. Моналики растими ипротиворноми примарии к тому, что увеленение ЭПА может в доцировать сключичной дограги и диригический інффини, что может привести к ученещимо ОЦК и снижению артериального давления (см. раздел фармакодинамические свойства). Рекоменді вана адекватная гидратация и мониторинг ОЦК (например, физикальное обследование, измер ние артериального давления, лабораторные анализы, включающие показатели финкции поче электролитный состав). Кетоацидоз, При появлении симптомов кетоацидоза, таких как тоц электроилизмен оссычае, кетонодице, при повытеления иншигимия ектонодицея, кома как изшигимия за рока, поерея алектата, боль в жизоти, ерезмерная жижда, повышенныя упомненность, кнур-шения дывания, нарушение ставния ким другие систомы, необходимо расскопревь вопрос опроведения любораторым занажное (визотная определение ектоновых теля в кромя и моче), (по диагистировымия диабетического гестомидоза лечение партагифоктичном искует прокрытия и начать адекватную поддерживающую терапию для нормализации состояния пациента. Пацие ты пожилого возраста (>65 лет). У пожилых пациентов чаше наблюдается снижение физиолого за поможно повроска (65 ме). У поможно пациентом часе мобледается с исихнеме филиполи-счески функций, а почеты вые утся, регаратиции, потому печене муста патейчаления удалия-категория пациентом спедует проводить под тацательным кобледениям. Инфокция половых ор-ганов. Во орекия лечения вприлагающем могут разливатысь грабитыме инфокция половых органов. Пологом сучерет проводить затеменной собеденныхе вышенных на верхаем правилающем в симптомога инфокций половых органов. При появления празвиков в симптомога тработных инфекций половых органов необходимо проведение соответствующей терапии. Ампутация нижней конечности. В долгосрочных клинических исследованиях другого ингибитора SGLT2 отмечалос коменность. В допосрочных коминенских исследованиях другого инибипоро SGIZ поменанос, учененняем ступа-на направляющих можих коменностой разкода кого полужена столь, Невласию, на направления ступа и дофил стенцифическим для всего фирмакологического класса. Важно кокуль-тировать исс выпаратов с соворным диобегом по станадатному профилалителескому укоду за сустами. Политалисты Приненение и количестическу предвудим связ заколя полужения мою. В комических исследованиях частога гипотамичеми у пациентов, принимающих игруп ганфозинкак в монотералии и в составе комбинированной тералии с другими гипогликемическими препаратами (за исключением инсулина, см. раздел «Побочное действие»), была такой же, как преводатиям да исключением модулива, си, раздел «Побочем действин»), была закой же, как при превейе плацей, об исключения рисс возветия рисс возветиям ститутельности и пответительности и преводати, и модули у преводатиям сутифотительной, и моблацию россиорень котрос со несениям даль-сиорены, преводатиям сутифотительном могут по выполнять и мобрем могуте выполнять им можена преводатиям и бот время в мечения виратизифотамном могут развиваться инфекции моченьнорации, путей, включая пиелонефрит. Следует проводить тщательное обследование пациентов для выявления воз можных признаков и симптомов инфекций мочевыводящих путей и, при необходимости, пров диль соответствующее лечение. Дооченском седечения ведскомическость читы применния мартигификами при применской созденной недостаточности (ПСВ). Н дукущимального колско (по жаксофикации МКМ) сприменсу, отом применения при КСВ Н дукущимального колско NVHM остуствует. Либораторное исследование мочи. В сяких смехамизми действия у пациентом, примимающих кпритификами, будут положительными результать аналигая на мличие глякование у детей. Эффективность и безопасность применения ипраглифлозина у дете

Фарманидинаментовие в замодействия. В замом друж и лекорственных средства и этратинфилых. Саместное применение с лекторственными средствам, сихимающими розень пложом, не зажитом на эффент пиратинфильмами с поменения об учета по техно об техно об техно быто предела по техно об техн

Суглат



АО «Астеллас Фарма», 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16. Тел. +7(495) 737-07-56. Факс +7 (495) 737-07-50.